

Petit Drill Junior

Petit Drill Junior: Leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem. Dla dzieci w wieku od 6 lat. Nie zawiera cukru, barwników ani parabenów. **Skład:** Glicerol, maltitol ciekły (E965), hydroksyetyloceluloza, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat truskawkowy, woda oczyszczona. Petit Drill Junior dzięki swoim składnikom tworzy ochronną warstwę i nawilża gardło, co umożliwia złagodzenie podrażnienia związanego z suchym kaszlem, również tego spowodowanego przez niektóre agresywne czynniki zewnętrzne, takie jak dym papierosowy, zanieczyszczenie, pył, suche powietrze itd. **Sposób użycia:** Aby odmierzyć dawkę 10 ml syropu należy użyć miarkę dołączoną do opakowania. Odmierzyć syrop do miarki. Należy zwrócić szczególną uwagę i przestrzegać określenia wygrawerowanego na miarce oznaczającego dawkę 10 ml. Dzieci w wieku od 6 lat: jednorazowo jedna dawka po 10 ml. W razie potrzeby można stosować 3 do 4 razy na dobę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 5 dni należy skonsultować się z lekarzem. W razie pominięcia dawki syropu Petit Drill Junior w wyznaczonym czasie, nie należy stosować podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo zalecaną dawkę. Po każdym użyciu przepłukać miarkę zimną wodą. Przed odłożeniem miarki do opakowania, upewnić się, że jest czysta. **Przeciwwskazania:** Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu. Dziedziczna nietolerancja fruktozy, ze względu na obecność maltitolu ulegającego przekształceniu do fruktozy. **Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** W przypadku wystąpienia oznak towarzyszących suchemu kaszlowi, wskazujących na poważny stan pacjenta (takich jak trudności w oddychaniu, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, nawracające wymioty, trudności z jedzeniem, biegunka, zmiany zachowania lub zaburzenia snu itp.) należy skonsultować się z lekarzem. W istocie kaszel jest często związany z wirusową infekcją dróg oddechowych, ale może także być oznaką choroby wymagającej specjalistycznego leczenia (zapalenie krtani, zapalenie płuc, astma itp.). W razie przypadkowego dostania się syropu do nosa, oczu lub uszu należy przepłukać te miejsca roztworem soli fizjologicznej, w celu usunięcia syropu. **Warunki przechowywania:** Szczelnie zamkniętą butelkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki. Nie stosować po upływie terminu przydatności wyrobu do użycia (etykieta na butelce i (lub) na opakowaniu). **Zawartość opakowania:** 200 ml syropu w butelce z nakrętką z zabezpieczeniem przed dziećmi oraz miarka z podziałką do doustnego podawania syropu. **Wytwórca:** Syrop: Pierre Fabre Medical Devices, 29, Avenue du Sidobre, 81106 Castres Cedex, Francja. **Miarka:** BORMIOLI ROCCO S.p.A., Viale Martiri della libertà, 1-43036 Fidenza(PR), Włochy. Informacji udziela: Pierre Fabre Médicament Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska, tel.: 22 559 63 00

Wyrób medyczny CE.