

Petit Drill

Petit Drill: Leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem. Dla niemowląt i dzieci, nie zawiera cukru, barwników ani parabenów. **Skład:** Glicerol, płynny maltitol (E965), hydroksyetyloceluloza, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat truskawkowy, woda oczyszczona. Petit Drill dzięki swojemu składowi tworzy cienką warstwę ochronną i nawilża gardło, co umożliwi złagodzenie podrażnienia związanego z suchym kaszlem, w tym kaszlem spowodowanym zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, takimi jak dym papierosowy, zanieczyszczenie, kurz, suche powietrze itp. **Sposób użycia:** Należy posługiwać się pipetą dołączoną do opakowania. Aby nabrać dawkę 5 ml syropu wprowadzić pipetę do butelki, odciągnąć biały tłok do czarnego oznaczenia na korpusie pipety. Wprowadzić końcówkę pipety do ust dziecka będącego w pozycji uniemożliwiającej dostanie się syropu do dolnych dróg oddechowych (aby zapobiec zachłyśnięciu). Następnie wolno i płynnym ruchem wcisnąć tłok pipety, by dziecko mogło połknąć syrop. W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności, aby podać wymienione poniżej dawki. Dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy: jednorazowo jedna dawka po 5 ml; Dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat: jednorazowo dwie dawki po 5 ml. W razie potrzeby można podać 3 do 4 jednorazowych dawek w ciągu 24 godzin. W przypadku pominięcia podania syropu Petit Drill o zamierzonej godzinie, nie należy stosować podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo zalecaną dawkę, dostosowaną do wieku dziecka. Po każdym użyciu należy przepłukać pipetę zimną wodą, kilkakrotnie nabierając i wypuszczając wodę. Przed włożeniem pipety do pudełka, należy sprawdzić, czy jest czysta. **Przeciwwskazania:** Niemowlęta w wieku poniżej 6 miesięcy. Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu. Dziedziczna nietolerancja fruktozy ze względu na obecność maltitolu przekształcanego do fruktozy. **Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** U niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy, konsultacja medyczna jest wskazana. W przypadku wystąpienia oznak towarzyszących suchemu kaszlowi, wskazujących na poważny stan pacjenta (takich jak trudności w oddychaniu, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, nawracające wymioty, trudności z jedzeniem, biegunka, zmiany zachowania lub zaburzenia snu itp.) należy skonsultować się z lekarzem. W istocie kaszel jest często związany z wirusową infekcją dróg oddechowych, ale może także być oznaką choroby wymagającej specjalistycznego leczenia (zapalenie krtani, zapalenie płuc, astma itp.). W razie przypadkowego kontaktu syropu z nosem, oczami lub uszami dziecka należy przemyć takie miejsce roztworem soli fizjologicznej, w celu usunięcia syropu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie pipetę. **Warunki przechowywania:** Szczelnie zamkniętą butelkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu (etykiecie butelki i/lub na pudełku). **Zawartość opakowania:** 125 ml syropu w butelce z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci oraz 5 ml pipeta dozująca do doustnego podawania syropu. **Wytwórca:** Syrop: Pierre Fabre Medical Devices, 29, avenue du Sidobre, 81106 Castres Cedex, Francja. **Pipeta:** ROVIPHARM ZA Lucinges, 86, route du plan d'eau, 01370 Treffort-Cuisiat, Francja **Informacji udziela:** Pierre Fabre Médicament Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska, tel.: 22 559 63 00

Wyrób medyczny CE.